

## **Priporočila za cepljenje otrok proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam s kombiniranim cepivom (OMRV)**

V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR) obvezno za otroke od dopolnjenih 11 mesecev starosti in mora biti opravljeno do dopolnjenih 18 mesecev starosti ter za zamudnike. Cepi se s kombiniranim cepivom proti OMR. Drugi odmerek cepiva proti OMR je obvezen za vstopnike v 1. razred osnovne šole in za zamudnike.

Cepljenje proti noricam je v skladu s Programom cepljenja »posebej priporočljivo za otroke, ki še niso preboleli noric, so pa v remisiji akutne levkemije ali so pri njih indicirani visoki odmerki kortikosteroidov ali imunosupresivnih zdravil zaradi bolezni ledvic, težke astme ali drugih bolezni ali pred presaditvijo organov ter po presaditvi krvotvornih matičnih celic. Cepljenje je priporočljivo tudi za otroke, katerih družinski člani imajo bolezenska stanja z okrnjeno imunostjo. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja v teh primerih postavi zdravnik ustrezne specialnosti. Cepljenje je priporočljivo tudi za vse otroke starejše od 12 mesecev, ki še niso preboleli noric. Cepljenje se opravi z dvema odmerkoma cepiva v razmaku 6 tednov ali več (ne manj kot 4 tedne).«

»Cepljenje proti noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih, kjer indikacijo postavi zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Ker je v Sloveniji na voljo tudi **kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam (OMRV)** se starši lahko odločijo tudi za samoplačniško cepljenje s tem cepivom. V takem primeru naj otrok dobi prvi odmerek cepiva proti OMRV v starosti **11-18 mesecev**, drugi odmerek pa 6 tednov do 3 mesece po prvem odmerku. V takih primerih otrok cepljenja proti OMR pred vstopom v šolo ne bo potreboval.

Če je otrok (samoplačniško) cepljen s prvim odmerkom kombiniranega cepiva proti OMRV in nato čez 6 tednov revakciniran z monovalentnim cepivom proti noricam (samoplačniško), bo drugi odmerek cepiva proti OMR prejel v skladu s Programom cepljenja, pred vstopom v šolo (na stroške ZZS).

V primeru, da ima otrok v anamnezi ali v družini (starši, sorojenci) vročinske krče, naj praviloma dobi prvi odmerek cepiva ločeno, posebej proti OMR in posebej proti noricam, ker nekatere raziskave nakazujejo minimalno povečano tveganje za vročinske krče po prvem odmerku cepiva proti MMRV v starosti 12-23 mesecev v primerjavi z ločenim cepljenjem (posebej proti OMR in posebej proti noricam), ne pa po drugem odmerku.\*

---

\* CDC. Use of combination measles, mumps, rubella, and varicella vaccine. Recommendations of the ACIP. MMWR 2010;59(No. RR-3):1-12.