

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrletno poročilo, 1. januar – 31. marec 2018

V obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **295 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 150 pri moških in 145 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **87 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (55 pri moških in 32 pri ženskah), med njimi trije primeri **klamidijskega limfograduloma (venerični) (LGV)** pri moških, **47 primerov gonoreje** (41 pri moških in šest pri ženskah), **13 primerov zgodnjega sifilisa** (12 primerov pri moških in en primer pri ženski) in **en primer neopredeljenega sifilisa** pri moškemu. Med ostalimi prijavljenimi spolno prenesenimi okužbami po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **70 primerov genitalnih bradavic (kondilomi)**, **45 primerov nespecifičnega uretritisa**, **31 primerov genitalnega herpesa** in **en primer izcedka iz sečnice moškega**.

Od 41 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je 20 moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Od 13 prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških je osem moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **53 odstotkov** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **27 odstotkov** ginekologi, **11 odstotkov** infektologi, **šest odstotkov mikrobiologi** in **tri odstotke** specialisti splošne medicine.

Med prijavljenimi primeri SPO sta bila **dva tuja državljana**.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2018. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2018.

Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2018

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
Celje	Ženski	0	0,0	1	0,7	6	4,0
	Moški	3	2,0	5	3,3	10	6,6
	Skupaj	3	1,0	6	2,0	16	5,3
Gorica	Ženski	0	0,0	0	0,0	2	3,9
	Moški	0	0,0	1	2,0	2	4,0
	Skupaj	0	0,0	1	1,0	4	3,9
Koper	Ženski	0	0,0	0	0,0	2	2,7
	Moški	0	0,0	1	1,3	6	8,1
	Skupaj	0	0,0	1	0,7	8	5,4
Kranj	Ženski	0	0,0	0	0,0	2	1,9
	Moški	2	2,0	2	2,0	6	5,9
	Skupaj	2	1,0	2	1,0	8	3,9
Ljubljana	Ženski	1	0,3	4	1,2	12	3,6
	Moški	4	1,2	23	7,1	18	5,5
	Skupaj	5	0,8	27	4,1	30	4,5
Maribor	Ženski	0	0,0	1	0,6	4	2,5
	Moški	3	1,9	4	2,5	7	4,4
	Skupaj	3	0,9	5	1,6	11	3,4
Murska Sobota	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	1,7
	Moški	0	0,0	1	1,8	4	7,0
	Skupaj	0	0,0	1	0,9	5	4,3
Novo mesto	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	4,3
	Moški	0	0,0	2	2,8	1	1,4
	Skupaj	0	0,0	2	1,4	4	2,8
Ravne	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
neznana	Ženski	0		0		0	
	Moški	0		0		0	
	Skupaj	0		0		0	
Skupaj (slovenski državljani)	Ženski	1	0,1	6	0,6	32	3,1
	Moški	12	1,2	39	3,8	54	5,3
	Skupaj	13	0,6	45	2,2	86	4,2
Tujci	Ženski	0		0		0	
	Moški	0		2		1	
	Skupaj	0		2		1	
Vsi skupaj	Ženski	1		6		32	
	Moški	12		41		55	
	Skupaj	13		47		87	

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 30. 4. 2018.

Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. januarja do 31. marca 2018

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
<15	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	6,6
	Moški	0	0,0	2	0,4	1	2,1
	Skupaj	0	0,0	2	2,1	4	4,3
20-24	Ženski	0	0,0	4	8,0	16	32,0
	Moški	0	0,0	4	7,6	15	28,4
	Skupaj	0	0,0	8	7,8	31	30,1
25-29	Ženski	0	0,0	1	1,6	6	9,9
	Moški	3	4,6	8	12,2	17	26,0
	Skupaj	3	2,4	9	7,1	23	18,2
30-34	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	4,4
	Moški	3	4,0	10	13,4	9	12,1
	Skupaj	3	2,1	10	7,0	12	8,4
35-44	Ženski	0	0,0	0	0,0	4	2,7
	Moški	5	3,1	10	6,2	12	7,4
	Skupaj	5	1,6	10	3,2	16	5,2
45-64	Ženski	1	0,3	1	0,3	0	0,0
	Moški	1	0,3	7	2,3	1	0,3
	Skupaj	2	0,3	8	1,3	1	0,2
≥65	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Skupaj	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Skupaj	Ženski	1	0,1	6	0,6	32	3,1
	Moški	12	1,2	41	4,0	55	5,4
	Skupaj	13	0,6	47	2,3	87	4,2

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 30. 4. 2018.

Izčrpnjši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/epidemiolosko_spremljanje_nb_slo_2016.pdf

REFERENCI

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017.