

## Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrtno poročilo, 1. april – 30. junij 2018

V obdobju od 1. aprila 2018 do 30. junija 2018 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **269 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 131 pri moških, 138 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **53 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (35 pri moških in 18 pri ženskah), **29 primerov gonoreje** (27 pri moških in dva primera pri ženskah), **devet primerov zgodnjega sifilisa** pri moških, **trije primeri neopredeljenega sifilisa** (dva primera pri moških in en pri ženskah), en primer poznega sifilisa pri moških in dva primera mehkega čankarja (en primer pri ženskah in en primer pri moških). Med ostalimi prijavljenimi spolno prenesenimi okužbami po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **60 primerov nespecifičnega uretritisa**, **70 primerov genitalnih bradavic** in **42 primerov genitalnega herpesa**.

Od 27 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je 15 moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze. Od devetih prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških je pet moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **60 odstotkov** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **28 odstotkov** ginekologi, **šest odstotkov** mikrobiologi in po **tri odstotke** specialisti splošne medicine in infektologi.

Med prijavljenimi primeri SPO ni bilo **tujih državljanov**.

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2018. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2018.

**Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2018**

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
Celje	Ženski	0	0,0	0	0,0	2	1,3
	Moški	0	0,0	5	3,3	3	2,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>	<b>5</b>	<b>1,7</b>
Gorica	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	1	1,0	1	2,0	1	2,0
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>
Koper	Ženski	0	0,0	0	0,0	2	2,7
	Moški	1	1,3	1	1,3	6	8,1
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>8</b>	<b>5,4</b>
Kranj	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	2,9
	Moški	3	3,0	3	3,0	3	3,0
	<b>Skupaj</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>2,9</b>
Ljubljana	Ženski	0	0,0	0	0,0	5	1,5
	Moški	2	0,6	13	4,0	18	5,5
	<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>	<b>13</b>	<b>2,0</b>	<b>23</b>	<b>3,5</b>
Maribor	Ženski	0	0,0	1	0,6	2	1,2
	Moški	1	0,6	2	1,3	2	1,3
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>4</b>	<b>1,2</b>
Murska Sobota	Ženski	0	0,0	1	1,7	0	0,0
	Moški	0	0,0	1	1,8	1	1,8
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>
Novo mesto	Ženski	0	0,0	0	0,0	4	5,8
	Moški	1	1,4	1	1,4	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>
Ravne	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
neznana	Ženski	0		0		0	
	Moški	0		0		0	
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Skupaj (slovenski državljani)	Ženski	0	0,0	2	0,2	18	1,7
	Moški	9	0,9	27	2,6	34	3,3
	<b>Skupaj</b>	<b>9</b>	<b>0,4</b>	<b>29</b>	<b>1,4</b>	<b>52</b>	<b>2,5</b>
Tujci	Ženski	0		0		0	
	Moški	0		0		1	
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>	
Vsi skupaj	Ženski	0		2		18	
	Moški	9		27		35	
	<b>Skupaj</b>	<b>9</b>		<b>29</b>		<b>53</b>	

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 25. 7. 2018.

**Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. aprila do 30. junija 2018**

		Zgodnji sifilis		Gonoreja		Klamidijska okužba – genitalna	
		Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000	Št. prij. primerov	Št. na 100.000
<15	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
15-19	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	2,2
	Moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
20-24	Ženski	0	0,0	0	0,0	7	14,2
	Moški	0	0,0	7	13,3	3	5,7
	<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>7</b>	<b>6,9</b>	<b>10</b>	<b>9,8</b>
25-29	Ženski	0	0,0	0	0,0	6	10,3
	Moški	1	1,6	1	1,6	9	14,4
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>15</b>	<b>12,4</b>
30-34	Ženski	0	0,0	0	0,0	3	4,5
	Moški	1	1,4	6	8,3	8	11,0
	<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>6</b>	<b>4,3</b>	<b>11</b>	<b>7,9</b>
35-44	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	2	1,2	7	4,3	15	9,2
	<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>7</b>	<b>2,3</b>	<b>15</b>	<b>4,8</b>
45-64	Ženski	0	0,0	0	0,0	1	0,3
	Moški	2	0,7	6	2,0	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>0,3</b>	<b>6</b>	<b>1,0</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
≥65	Ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Moški	3	1,8	0	0,0	0	0,0
	<b>Skupaj</b>	<b>3</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Skupaj	Ženski	0	0,0	0	0,0	18	1,7
	Moški	9	0,9	27	2,6	35	3,4
	<b>Skupaj</b>	<b>9</b>	<b>0,4</b>	<b>27</b>	<b>1,3</b>	<b>53</b>	<b>2,6</b>

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 25. 7. 2018.

Izčrpnější podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

[http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spo\\_letno\\_2016.pdf](http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/spo_letno_2016.pdf).

#### REFERENCI

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017.