

Prijavljeni primeri spolno prenesenih okužb v Sloveniji

Četrletno poročilo, 1. oktober – 31. december 2015

V obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2015 je bilo na osnovi *Zakona o nalezljivih boleznih* (Ur. l. št. 69/95) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje prijavljenih **297 primerov** spolno prenesenih okužb (SPO), od tega 158 pri moških in 139 pri ženskah.

Prijavljenih je bilo **64 primerov spolno prenesene klamidijske okužbe** (46 pri moških in 18 pri ženskah), **24 primerov gonoreje** pri moških, **19 primerov zgodnjega sifilisa** (15 pri moških in štiri pri ženskah), **sedem primerov neopredeljenega sifilisa** (pet pri moških in dva pri ženskah). Med ostalimi prijavljenimi spolno prenesenimi boleznimi po sindromih in/ali povzročiteljih je bilo **88 primerov genitalnih bradavic**, **61 primerov nespecifičnega uretritisa** in **34 primerov genitalnega herpesa**.

Od 24 prijavljenih primerov gonoreje pri moških je šest moških navedlo vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih. Od 15 prijavljenih primerov zgodnjega sifilisa pri moških so trije moški navedli vsaj enega moškega spolnega partnerja v zadnjih treh mesecih pred postavitvijo diagnoze.

Skupaj so **59 odstotkov** primerov SPO prijavili dermatovenerologi, **29 odstotkov** ginekologi, **osem odstotkov** infektologi, **dva odstotka** zdravniki splošne medicine, **en odstotek** mikrobiologi ter po en primer epidemiolog in pediater.

Med prijavljenimi primeri SPO sta bila **dva tuja državljana** (en državljan iz Avstralije in ena državljanka iz Bosne in Hercegovine).

Podatki o prijavljenih primerih in prijavni incidenci SPO podcenjujejo pojavljanje teh okužb v prebivalstvu, predvsem spolno prenesene klamidijske okužbe, saj je v Sloveniji opravljenih zelo malo laboratorijskih preiskav na klamidije. Prijavljeno število primerov zato nikakor ni zanesljiv pokazatelj bremena te okužbe med prebivalstvom. SPO pogosto ostanejo neprepoznane, številne diagnosticirane pa niso prijavljene. Razlike v prijavnih incidencah SPO med različnimi zdravstvenimi regijami predvidoma ne odražajo različnega bremena teh okužb med regijami, temveč nakazujejo razlike v prepoznavanju in prijavljanju teh okužb med različnimi specialisti in različnimi regijami.

V **tabeli 1** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2015. V **tabeli 2** so prikazani prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2015.

Tabela 1: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in regijo bivanja v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2015

		zgodnji sifilis		gonoreja		klamidijska okužba – genitalna	
		št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000
Celje	ženski	1	0,7	0	0,0	3	2,0
	moški	2	1,3	1	0,7	3	2,0
	<i>skupaj</i>	3	1,0	1	0,0	6	2,0
Gorica	ženski	0	0,0	0	0,0	2	3,9
	moški	0	0,0	1	2,0	2	3,9
	<i>skupaj</i>	0	0,0	1	1,0	4	3,9
Koper	ženski	0	0,0	0	0,0	2	2,7
	moški	1	1,4	1	1,4	5	6,8
	<i>skupaj</i>	1	0,7	1	0,7	7	4,7
Kranj	ženski	0	0,0	0	0,0	3	2,9
	moški	0	0,0	7	6,9	6	5,9
	<i>skupaj</i>	0	0,0	7	3,4	9	4,4
Ljubljana	ženski	1	0,3	0	0,0	4	1,2
	moški	5	1,6	11	3,4	25	7,8
	<i>skupaj</i>	6	0,9	11	1,7	29	4,4
Maribor	ženski	0	0,0	0	0,0	2	1,2
	moški	3	1,9	1	0,6	3	1,9
	<i>skupaj</i>	3	0,9	1	0,3	5	1,5
Murska Sobota	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Novo mesto	ženski	2	2,9	0	0,0	1	1,4
	moški	2	2,8	1	1,4	1	1,4
	<i>skupaj</i>	4	2,9	1	0,7	2	1,4
Ravne	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	1	2,8	0	0,0	1	2,8
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
neznana	ženski	0		0		0	
	moški	1		1		0	
	<i>skupaj</i>	1		1		0	
<i>skupaj (slovenski državljani)</i>	ženski	4	0,4	0	0,0	17	1,6
	moški	15	1,5	24	2,4	46	4,5
	<i>skupaj</i>	19	0,9	24	1,2	63	3,1
tujci	ženski	0		0		1	
	moški	0		0		0	
	<i>skupaj</i>	0		0		1	
<i>vsi skupaj</i>	ženski	4		0		18	
	moški	15		24		46	
	<i>skupaj</i>	19		24		64	

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 15.02.2016.

Tabela 2: Prijavljeni primeri in prijavne incidence zgodnjega sifilisa, gonoreje in spolno prenesene klamidijske okužbe glede na spol in starostno skupino v Sloveniji od 1. oktobra do 31. decembra 2015

		zgodnji sifilis		gonoreja		klamidijska okužba – genitalna	
		št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000	št. prij. primerov	št. na 100.000
<15	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19	ženski	0	0,0	0	0,0	3	7,9
	moški	0	0,0	0	0,0	1	2,0
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	4	4,6
20-24	ženski	0	0,0	0	0,0	5	9,2
	moški	1	1,7	5	8,7	9	15,7
	<i>skupaj</i>	1	0,9	5	4,5	14	12,5
25-29	ženski	1	1,5	0	0,0	2	3,0
	moški	6	8,4	8	11,2	19	26,7
	<i>skupaj</i>	7	5,1	8	5,8	21	15,4
30-34	ženski	3	4,1	0	0,0	5	6,9
	moški	3	3,7	5	6,2	9	11,2
	<i>skupaj</i>	6	3,9	5	3,3	14	9,1
35-44	ženski	0	0,0	0	0,0	3	2,1
	moški	3	1,9	4	2,5	6	3,8
	<i>skupaj</i>	3	1,0	4	1,3	9	4,0
45-64	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	2	0,7	2	0,7	1	0,3
	<i>skupaj</i>	2	0,3	2	0,3	1	0,2
≥65	ženski	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	moški	0	0,0	0	0,0	1	0,7
	<i>skupaj</i>	0	0,0	0	0,0	1	0,3
<i>skupaj</i>	ženski	4	0,4	0	0,0	18	1,7
	moški	15	1,5	24	2,4	46	4,5
	<i>skupaj</i>	19	0,9	24	1,2	64	3,1

Vir podatkov: Prijave spolno prenesenih okužb, 15.02.2016.

Izčrpnjši podatki o SPO v Sloveniji za obdobje zadnjih desetih let so predstavljeni v poročilu »Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2014« (2), ki je na voljo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS: <http://www.nijz.si/epidemiolosko-spremljanje-nalezljivih-bolezni-letna-porocila>.

REFERENCE

- (1) Zakon o nalezljivih boleznih /ZNB/. Ur. l. RS, št. 69/1995.
- (2) Klavs I, Kustec T (ur.). Spolno prenesene okužbe v Sloveniji, letno poročilo 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015.