

## Priporočila za cepljenje razseljenih oseb iz Ukrajine v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb

Za zaščito javnega zdravja je pomembno, da so poleg prebivalcev Slovenije, cepljene tudi osebe v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb in Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito. V redni Program cepljenja in zaščite z zdravili je smiselno vključiti vse predšolske in šolske otroke, odrasle pa v primeru ugotovljene indikacije.

V kolikor predšolski in šolski otrok nima dokazov o cepljenju z ustreznim cepivom in prejetem zadostnem številu odmerkov glede na starost v skladu z letnim Programom cepljenja in zaščite z zdravili, se pri njem izvede cepljenje.

Cepljenje je **veljavno, če ima oseba pisno dokumentacijo ali »zanesljiv ustni podatek« o opravljenem cepljenju\*** po shemi, ki je primerljiva s slovenskim programom cepljenja (v pomoč izvajalcem je v prilogi tudi ukrajinski koledar cepljenja). Če nima ustrezne dokumentacije ali zanesljivega ustnega podatka o opravljenem cepljenju ali v primeru dvoma, se oseba smatra kot necepljena, pri njej je potrebno začeti s cepljenjem glede na starost (glej Koledar cepljenja otrok v Sloveniji) in dejavnike tveganja, razen, če se ugotovijo razlogi za opustitev. Če je oseba že pričela s cepljenjem, pa še ni popolno cepljena, se cepljenje nadaljuje z ustreznim številom odmerkov (odmerkov se ne ponavlja, cepljenja se ne začneja znova). Cepljeni osebi je potrebno ob začetku cepljenja izdati Knjižico o cepljenju, v katero se vpišejo vsa opravljena cepljenja, če pa ima ustrezen identifikator, se cepljenje vpiše v eRCO (<https://www.nijz.si/sl/elektronski-register-cepljenih-oseb-in-nezelenih-ucinkov-po-cepljenju-erco>).

Po programu cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto so za predšolske oziroma šolske otroke predvidena cepljenja proti: davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hemofilusu tipa b, hepatitisu B, pnevmokoknim okužbam, ošpicam, mumpsu, rdečkam, KME, okužbam s HPV, gripi, ponudi pa se jim tudi cepljenje proti covid-19.

**Cepljenje proti tuberkulozi** je v skladu s Programom cepljenja predvideno za:

- novorojenčke, katerih starši so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka priselili iz držav z višjo incidenco tuberkuloze. Seznam držav z višjo incidenco tuberkuloze je objavljen na spletni strani Registra za tuberkulozo: [http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-tuberkulozo/datoteke/seznam\\_drzav.pdf](http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-tuberkulozo/datoteke/seznam_drzav.pdf)
- otroke, katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze.

Dodatna priporočila glede cepljenja proti tuberkulozi so dostopna na spletni strani Registra za tuberkulozo (glej zgoraj).

Pri necepljenih razseljenih osebah iz Ukrajine se **prednostno opravi cepljenje proti ošpicam in otroški paralizi**.

Cepljenje proti otroškim boleznim je v Sloveniji obvezno. Pogoj za vključitev ukrajinskih otrok v vrtec je cepljenje z enim odmerkom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (enako kot za otroke v RS.) Pred vstopom ukrajinskih otrok v šolo se preveri cepilni status in se cepljenje zagotovi v enakem obsegu kot otrokom v RS.

\* V primeru »zanesljivega ustnega podatka« o opravljenem cepljenju se v cepilno knjižico zabeleži podatek o zaporedni številki prejetega odmerka (z opombo, da je oseba po navedbi že prejela določeno št. odmerkov)

### Koledar rednih cepljenj predšolskih in šolskih otrok v Sloveniji

STAROST/ ŠOLSKO OBDOBJE	NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
<b>Prvo in drugo leto starosti</b>	
<b>trije meseci</b>	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek DTPHibIPV-HBV), pnevmokokne okužbe (1. odmerek PCV)
<b>pet mesecev</b>	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek DTPHibIPV-HBV, pnevmokokne okužbe (2. odmerek PCV)
<b>11 do 18 mesecev</b>	ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR) davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek DTPHibIPV-HBV) pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV)
<b>eno leto</b>	klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
<b>6 do 23 mesecev</b>	gripa (1 ali 2 odmerka v sezoni)
<b>Tretje leto starosti</b>	
<b>tri leta</b>	klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
<b>Pred vstopom v šolo</b>	
<b>pet do šest let</b>	ošpice (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OMR) in hepatitis B (1. in 2. odmerek HBV)
<b>Šolsko obdobje</b>	
<b>1. razred OŠ</b>	hepatitis B (3. odmerek HBV)
<b>3. razred OŠ</b>	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (5. odmerek – revakcinacija DTP)
<b>6. razred OŠ</b>	okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva)
<b>ob sistematskem pregledu v srednji šoli</b>	tetanus (T) (6. odmerek – revakcinacija T)

Navodila za cepljenje zamudnikov so objavljena na naslednji povezavi:

[https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2022\\_uporaba\\_kombiniranih\\_cepiv\\_izven\\_registracij\\_e.pdf](https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2022_uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracij_e.pdf)

Za **odrasle** razseljene osebe iz Ukrajine je predvideno cepljenje v enakem obsegu kot za slovenske prebivalce (v skladu s programom cepljenja oz. nacionalnimi smernicami in algoritmi).

### Koledar rednih cepljenj\* odraslih

STAROST/STANJE	NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
<b>&gt;26 let</b>	davica (D), tetanus (T), (1 odmerek cepiva DT na 10 let)
<b>49 let</b>	klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
<b>&gt;65 let</b>	gripa (1 odmerek v sezoni)
<b>nosečnice</b>	oslovski kašelj (P) (1 odmerek cepiva DTP od 24. tedna nosečnosti dalje) gripa (1 odmerek v sezoni)

\* Cepljenja zaradi zdravstvenih indikacij so opredeljena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z zdravili

Prilagamo koledar cepljenj, ki jih izvajajo v Ukrajini, kot pomoč izvajalcem cepljenja.

### Koledar cepljenj v Ukrajini

STAROST	NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIJO V UKRAJINI
<b>Prvih 18 mesecev starosti</b>	
<b>ob rojstvu (1. dan)</b>	hepatitis B (1. odmerek)
<b>3.-5. dan</b>	tuberkuloza (en odmerek)
<b>2 meseca</b>	hepatitis B (2. odmerek) davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (IPV), hemofilus influence tip b (1. odmerek)
<b>4 mesece</b>	davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (IPV), hemofilus influence tip b (2. odmerek)
<b>6 mesecev</b>	hepatitis B (3. odmerek) davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (OPV) (3. odmerek)
<b>12 mesecev</b>	hemofilus influence tip b (3. odmerek) ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek)
<b>18 mesecev</b>	davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (OPV) (4. odmerek)
<b>2 – 16 let starosti</b>	
<b>6 let</b>	davica, tetanus, otroška paraliza (OPV) (5. odmerek) ošpice, mumps, rdečke (2. odmerek)
<b>14 let</b>	otroška paraliza (OPV) (6. odmerek)
<b>16 let</b>	davica, tetanus (6. odmerek)
<b>Odrasli</b>	
<b>vsakih 10 let</b>	davica, tetanus (en odmerek cepiva)