

Priporočila za cepljenje razseljenih oseb iz Ukrajine v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb

Za zaščito javnega zdravja je pomembno, da so poleg prebivalcev Slovenije, cepljene tudi osebe v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb in Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito. V redni Program cepljenja in zaščite z zdravili je smiselno vključiti vse predšolske in šolske otroke, odrasle pa v primeru ugotovljene indikacije.

V kolikor predšolski in šolski otrok nima dokazov o cepljenju z ustreznim cepivom in prejetem zadostnem številu odmerkov glede na starost v skladu z letnim Programom cepljenja in zaščite z zdravili, se pri njem izvede cepljenje.

Cepljenje je **veljavno, če ima oseba pisno dokumentacijo ali »zanesljiv ustni podatek« o opravljenem cepljenju*** po shemi, ki je primerljiva s slovenskim programom cepljenja (v pomoč izvajalcem je v prilogi tudi ukrajinski koledar cepljenja). Če nima ustrezne dokumentacije ali zanesljivega ustnega podatka o opravljenem cepljenju ali v primeru dvoma, se oseba smatra kot necepljena, pri njej je potrebno začeti s cepljenjem glede na starost (glej Koledar cepljenja otrok v Sloveniji) in dejavnike tveganja, razen, če se ugotovijo razlogi za opustitev. Če je oseba že pričela s cepljenjem, pa še ni popolno cepljena, se cepljenje nadaljuje z ustreznim številom odmerkov (odmerkov se ne ponavlja, cepljenja se ne začne znova). Cepljeni osebi je potrebno ob začetku cepljenja izdati Knjižico o cepljenju, v katero se vpišejo vsa opravljena cepljenja, če pa ima ustrezen identifikator, se cepljenje vpiše v eRCO (<https://www.nijz.si/sl/elektronski-register-cepljenih-oseb-in-nezelenih-ucinkov-po-cepljenju-erco>).

Po programu cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto so za predšolske oziroma šolske otroke predvidena cepljenja proti: davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, hemofilusu tipa b, hepatitisu B, pnevmokoknim okužbam, ošpicam, mumpsu, rdečkam, KME, okužbam s HPV, gripi, ponudi pa se jim tudi cepljenje proti covid-19.

Cepljenje proti tuberkulozi je v skladu s Programom cepljenja predvideno za:

- novorojenčke, katerih starši so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka priselili iz držav z višjo incidenco tuberkuloze. Seznam držav z višjo incidenco tuberkuloze je objavljen na spletni strani Registra za tuberkulozo: http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-tuberkulozo/datoteke/seznam_drzav.pdf
- otroke, katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze.

Dodatna priporočila glede cepljenja proti tuberkulozi so dostopna na spletni strani Registra za tuberkulozo (glej zgoraj).

Pri necepljenih razseljenih osebah iz Ukrajine se **prednostno opravi cepljenje proti ošpicam in otroški paralizi**.

* V primeru »zanesljivega ustnega podatka« o opravljenem cepljenju se v cepilno knjižico zabeleži podatek o zaporedni številki prejetega odmerka (z opombo, da je oseba po navedbi že prejela določeno št. odmerkov)

Koledar rednih cepljenj predšolskih in šolskih otrok v Sloveniji

STAROST/ ŠOLSKO OBDOBJE	NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO
Prvo in drugo leto starosti	
trije meseci	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek DTPHibIPV-HBV), pnevmokokne okužbe (1. odmerek PCV)
pet mesecev	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek DTPHibIPV-HBV, pnevmokokne okužbe (2. odmerek PCV)
11 do 18 mesecev	ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR) davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek DTPHibIPV-HBV) pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV)
eno leto	klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
6 do 23 mesecev	gripa (1 ali 2 odmerka v sezoni)
Tretje leto starosti	
tri leta	klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME)
Pred vstopom v šolo	
pet do šest let	ošpice (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OMR) in hepatitis B (1. in 2. odmerek HBV)
Šolsko obdobje	
1. razred OŠ	hepatitis B (3. odmerek HBV)
3. razred OŠ	davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (5. odmerek – revakcinacija DTP)
6. razred OŠ	okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva)
ob sistematskem pregledu v srednji šoli	tetanus (T) (6. odmerek – revakcinacija T)

Navodila za cepljenje zamudnikov so objavljena na naslednji povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2022_uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracij_e.pdf

Za **odrasle** razseljene osebe iz Ukrajine je predvideno le cepljenje ob epidemioloških/zdravstvenih indikacijah v skladu z nacionalnimi smernicami in algoritmi, priporoča pa se tudi cepljenje proti covid-19.

Prilagamo koledar cepljenj, ki jih izvajajo v Ukrajini, kot pomoč izvajalcem cepljenja.

Koledar cepljenj v Ukrajini

STAROST	NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIJO V UKRAJINI
Prvih 18 mesecev starosti	
ob rojstvu (1. dan)	hepatitis B (1. odmerek)
3.-5. dan	tuberkuloza (en odmerek)
2 meseca	hepatitis B (2. odmerek) davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (IPV), hemofilus influence tip b (1. odmerek)
4 mesece	davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (IPV), hemofilus influence tip b (2. odmerek)
6 mesecev	hepatitis B (3. odmerek) davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (OPV) (3. odmerek)
12 mesecev	hemofilus influence tip b (3. odmerek) ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek)
18 mesecev	davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (OPV) (4. odmerek)
2 – 16 let starosti	
6 let	davica, tetanus, otroška paraliza (OPV) (5. odmerek) ošpice, mumps, rdečke (2. odmerek)
14 let	otroška paraliza (OPV) (6. odmerek)
16 let	davica, tetanus (6. odmerek)
Odrasli	
vsakih 10 let	davica, tetanus (en odmerek cepiva)