

# CNB . NOVICE

## SLOVENIJA




Februar 2003

Št. 2

V februarju 2003 je bilo v Sloveniji prijavljenih 5557 primerov nalezljivih bolezni. V primerjavi z mesecem januarjem 2003 je bilo prijavljenih 1887 primerov več nalezljivih bolezni, v primerjavi z februarjem 2002 pa je število prav tako više in sicer za 1739 prijav. Kot je razvidno iz spodnje slike, je število prijavljenih primerov bistveno više od petletnega povprečja za mesec februar. V številu prijav niso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza.

Stopnja obolenosti je bila v februarju 2003 278,9 na 100.000 prebivalcev.

**Slika 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH**



Najvišja stopnja obolenosti je bila v novomeški regiji, ki ji sledita kranjska in koprskinja regija. Najnižja obolenost je bila v koroški regiji (preglednica 1).

**Preglednica 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1.2. DO 28.2.2003**

REGIJA	ŠT. PRIMEROV	Mb/100000
CELJE	800	267,6
NOVA GORICA	273	264,7
KOPER	557	401,3
KRANJ	800	405,8
LJUBLJANA	1726	287,0
MARIBOR	520	162,5
M. SOBOTA	265	213,5
NOVO MESTO	552	409,4
RAVNE	64	86,4
SKUPAJ	5557	278,9

V februarju 2003 so bile daleč najpogosteje prijavljena bolezen norice (2266), kar je za zimske mesece značilno. Norice predstavljajo skoraj 41% vseh prijav v tem mesecu. Sledijo enterokolitisi neznane etiologije (666) in virusne črevesne okužbe (623), med katerimi je bilo prijavljenih 279 okužb z malimi okroglimi virusi, 244 rotavirusnih enteritisov, 17 adenovirusnih enteritisov ter 83 enteritisov pri katerih virus ni bil določen. Na četrtem mestu je

škrlatinka (423), sledi ji akutni tonsilitis (390). Obe bolezni sta prav tako značilni za mrzle mesece. Mikrosporija je na šestem mestu (210). Največ prijav mikrosporije je prispelo iz kranjske regije (152). Na sedmem mestu so streptokokne angine. Med 10 najpogosteje prijavljenimi bolezni beležimo vsak mesec tudi šen. V opazovanem mesecu je na osmem mestu (92), sledita nedoločena pljučnica (101) in lymbska borelioza (90).

Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu januarju 90,4 % vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

**Preglednica 2: DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V FEBRUARJU 2003**

DIAGNOZA	JAN 2003	FEB 2003	Mb/100.000
NORICE	1639	2266	113,7
GASTROENTEROKOLITIS*	510	666	33,4
VIRUSNE ČREV. INFKEKCIJE	321	623	31,2
ŠKRLATINKA	223	423	21,2
AKUTNI TONSILITIS	202	390	19,5
MIKROSPORIJA	100	210	10,5
STREPTOKOKNA ANGINA	86	139	6,9
ŠEN	92	119	5,9
PLJUČNICA, nedoločena	48	101	5,0
LYME BORELIOZA	67	90	4,5
SKUPAJ	4705	5027	252,3

\* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

Od bolezni, proti katerim se izvaja obvezno cepljenje je bilo prijavljenih 10 primerov **oslovskega kašlja**. V okolini Ilirske Bistrike je v februarju zbolelo 7 otrok, od tega 6 šolarjev, ki so bili cepljeni proti oslovskemu kašlju in en mesec stara deklica, ki še ni bila cepljena. Skupno je v prvih dveh mesecih letosnjega leta zbolelo na tem območju že 11 otrok, zato ZZV Koper pojav obravnava kot epidemijo. Ostali trije primeri so bili prijavljeni iz kranjskega in ljubljanskega območja.

Prejeli smo prvo prijavo **rdečk** letos. Zbolel je 16-mesečni deček iz okolice Celja, ki še ni bil cepljen proti rdečkam. Drugih otroških bolezni proti katerim poteka sistematsko cepljenje v mesecu februarju nismo beležili.

Prejeli smo 6 prijav akutnega **hepatitisa A**, eno prijavо **akutnega hepatitisa B**, 6 prijav **kroničnega hepatitisa C** ter 8 prijav **nosilstva HBs antigena**.


V februarju 2003 je bilo prijavljenih 20 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. V desetih primerih povzročitelj

ni bil dokazan. Med znanimi povzročitelji seps so bili: *Staphylococcus aureus* oz. nedoločen streptokok, *Escherichia coli*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae*, nedoločena Kandida in koagulaza negativni stafilokok.

Prejeli smo 5 prijav **gnojnega meningitisa**. Zaradi pnevmokonega meningitisa sta zbolela 45-letni moški in 59-letna ženska, zaradi meningokoknega meningitisa je zbolel 16-letni dijak, v ostalih dveh primerih pa povzročitelj ni bil izoliran.

V februarju jo bilo prijavljenih 90 primerov **lymske borelioze**. Od prijavljenih primerov je bil eritema migrans prijavljen 83-krat, 4-krat polinevropatijski in 3-krat artritis. V lanskem februarju je bilo prijavljenih 81 primerov lymske borelioze.

**Slika 2: LYME BORELIOZA PO MESECIH V LETIH 2002 IN 2003** (po datumu prijave)



## UMRLI

V opazovanem mesecu smo prejeli 8 prijav smrti zaradi nalezljive bolezni. Zaradi nedoločene pljučnice so umrli trije moški stari 60, 73 in 74 let ter 89-letna ženska. Zaradi sepse pa prav tako trije moški stari 44 in dva 74 let ter 72-letna ženska.

## EPIDEMIJE

V februarju 2003 so bile prijavljene 3 epidemije nalezljivih bolezni, vse iz ljubljanskega območja.

**Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana** je prijavil dve epidemiji gastroenterokolitisoval med otroci dveh ljubljanskih vrtcev. V prvih je zbolelo 19 od 42-tih izpostavljenih otrok, v drugih pa 7 od 13 izpostavljenih. En otrok je bil zaradi težje klinične slike hospitaliziran. Otroci so pretežno bruhali in imeli drisko. Povzročitelj še ni bil izoliran.

V epidemični obliku se je pojavila streptokokna angina med varovanci vrtca v katerem je zbolelo 5 od 18 varovancev.


## GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EISS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju oktober 2000 do februarja

2003 so dostopni na spletni strani Interneta <http://www.eurosurveillance.org>

(A. Kraigher, A. Hočvar Grom, M. Sočan, L. Pahor)

**Slika 3: SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKTOV PREKO MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 2000 DO FEBRUARJA 2003, PO TEDNIH**



**Slika 4: GIBANJE ROTAVIRUSNIH IN NOROVIRUSNIH DRISK V LETIH 2001, 2002 IN 2003**

