

CNB . NOVICE

SLOVENIJA

Marec 2003




Št. 3

V marcu 2003 je bilo v Sloveniji prijavljenih 4858 primerov nalezljivih bolezni. V primerjavi z mesecem februarjem 2003 je bilo prijavljenih 699 primerov manj nalezljivih bolezni, v primerjavi z marcem 2002 pa je število višje in sicer za 1549 prijav. Kot je razvidno iz spodnje slike, je število prijavljenih primerov bistveno višje od petletnega povprečja za mesec marec. V številu prijav niso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza.

Stopnja obolenosti je bila v marcu 2003 243,8 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH



Najvišja stopnja obolenosti je bila v novomeški regiji, ki ji sledita koprskna in novogoriška regija. Najnižja obolenost je bila v mariborski regiji (preglednica 1).

Preglednica 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1.3. DO 31.3.2003

REGIJA	ŠT. PRIMEROV	Mb/100000
CELJE	710	237,5
NOVA GORICA	337	326,7
KOPER	540	389,1
KRANJ	629	319,1
LJUBLJANA	1055	175,4
MARIBOR	735	42,1
M. SOBOTA	171	137,8
NOVO MESTO	573	425,0
RAVNE	108	145,9
SKUPAJ	4858	243,8

V marcu 2003 so bile daleč najpogosteje prijavljena bolezen norice (2150). Norice predstavljajo 44% vseh prijav v tem mesecu. Sledijo enterokolitisi neznane etiologije (593), škrlatinka (344) in akutni tonsilitis (323). Polovico manj kot v preteklem mesecu je bilo prijavljenih virusnih črevesnih okužb (302), ki so na petem mestu. Med slednjimi je bilo prijavljenih 87 okužb z malimi okroglimi virusi, 238 rotavirusnih enteritisov, 15 adenovirusnih enteritisov ter 22 enteritisov pri katerih virus ni bil določen. Na šestem mestu je streptokokna angina (183),

takoj za njo pa pljučnica nedoločenega povzročitelja (141). Mikrosporija je na osmem mestu (134). Na zadnjih dveh mestih sta šen (101) in erythema infectiosum. Slednji se je v povečanem številu pojavil oz. prijavil le v celjski regiji.

Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu marcu 89,7 % vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V MARCU 2003

DIAGNOZA	FEB 2003	MAR 2003	Mb/100.000
NORICE	2266	2150	107,9
GASTROENTEROKOLITIS*	666	593	29,7
ŠKRLATINKA	423	344	17,2
AKUTNI TONSILITIS	390	323	16,2
VIRUSNE ČREV. INFKEKCIJE	623	302	15,1
STREPTOKOKNA ANGINA	139	183	9,1
PLJUČNICA, nedoločena	101	141	7,0
MIKROSPORIJA	210	134	6,7
ŠEN	119	101	5,0
ZOSTER	87	78	3,9
SKUPAJ	4814	4349	218,3

* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

Od bolezni, proti katerim se izvaja obvezno cepljenje je bilo prijavljenih 20 primerov **oslovskega kašla**. V okolini Ilirske Bistrike je od februarja v teku epidemija oslovskega kašla. Skupno je zbolelo je 35 oseb od katerih jih je 20 zbolelo marca 2003. Poleg teh sta bila dva primera prijavljena tudi v ljubljanski regiji.

Prejeli smo drugo prijavo **rdečk** letos. Zbolel je 8-letni deček iz okolice Radovljice. Podatka o morebitnem cepljenju še nismo prejeli.

Prijavljena sta bila tudi dva primera **mumpsa**. Zbolela je 12-letna deklica, ki je bila cepljena leta 1991 in 26-letni moški, ki ni bil cepljen proti mumpsu.

Drugih otroških bolezni proti katerim poteka sistematsko cepljenje v mesecu februarju nismo beležili.

Prejeli smo 1 prijavo akutnega **hepatitisa A**, 4 prijave **akutnega hepatitisa B**, 3 prijave **akutnega hepatitisa C**, 10 prijav **kroničnega hepatitisa C**, dve prijavi **kroničnega hepatitisa B** ter 4 prijave **nosilstva HBs antigena**.


V marcu 2003 je bilo prijavljenih 28 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. V sedmih primerih povzročitelj ni bil dokazan. Med znanimi povzročitelji seps so bili: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus*

influenzae, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida* ter nedoločen stafilokok in nedoločen streptokok.

Prejeli smo 3 prijave **gnojnega meningitisa**. Zaradi hemofilusnega meningitisa je zbolel 7-letni deček. V ostalih dveh primerih povzročitelj ni bil ugotovljen, zbolela pa sta 83-letni moški in 7-letni deček.

V marcu jo bilo prijavljenih 56 primerov **lymske borelioze**. Od prijavljenih primerov je bil eritema migrans prijavljen 50krat, 5-krat polinevropatijska in 1-krat artritis. V lanskem marcu je bilo prijavljenih 76 primerov lymske borelioze.

Slika 2: LYME BORELIOZA PO MESECIH V LETIH 2002 IN 2003 (po datumu prijave)



UMRLI

V opazovanem mesecu smo prejeli 6 prijav smrti zaradi nalezljive bolezni. Zaradi nedoločene pljučnice je umrla 85-letna ženska. Zaradi sepse so umrli 63, 70, 76 in 84-letni moški ter 43-letna ženska.

EPIDEMIJE

V marcu 2003 je bila prijavljena le 1 epidemija nalezljive bolezni.


Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je prijavil epidemijo rotavirusnega enteritisa med varovanci vrtca. Bolezen se je prenašala s kontaktom. Zbolelo je 15 otrok od 198 izpostavljenih. Trije otroci so bili zaradi težje klinične slike hospitalizirani.

GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EISS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju oktober 2000 do marca 2003 so dostopni na spletni strani Interneta <http://www.eurosurveillance.org>

(A. Kraigher, A. Hočevar Grom, M. Sočan, L. Pahor)

Slika 3: SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFETKOV PREKO MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 2000 DO MARCA 2003, PO TEDNIH



Slika 4: GIBANJE ROTAVIRUSNIH IN NOROVIRUSNIH DRISK V LETIH 2001, 2002 IN 2003

