

## CELJSKI EPIDEMIOLOŠKI VESTNIK MAREC 2021

V mesecu **marcu 2021** smo iz regije Celje prejeli **4020 prijav\*** nalezljivih bolezni. Stopnja obolevanja (**132.8/10 000 prebivalcev**) je bila višja kot marca 2020 in višja od petletnega povprečja (10.1/10 000 prebivalcev).

Z upoštevanjem nove koronavirusne bolezni je bilo petletno povprečje nalezljivih bolezni preseženo v vseh upravnih enotah. Najnižjo stopnjo obolevnosti nalezljivih bolezni, brez covid-19, smo sicer zabeležili v **UE Brežice**, kjer

razen covid-19 niso prijavili nobene druge nalezljive bolezni.

Najpogosteje prijavljene nalezljive bolezni v tem mesecu so bile: **COVID-19, norice, herpes zoster, kampilobakterioza in drugi bakterijski enteritis**.

\*V tem številu niso upoštevani primeri AIDS, SPO, tuberkuloze ter pljučnic (MKB-10: J12, J15-18).

### GIBANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PO UPRAVNIH ENOTAH V MARCU 2021

	BREŽICE	CELJE	LAŠKO	MOZIRJE	SEVNICA	KONJICE	ŠENTJUR	ŠMARJE	VELENJE	ŽALEC	SKUPAJ	MAREC 2020	POVPR. 2016-2020
KAMPILOBAKTERIOZA	-	2	4	-	-	1	2	-	1	1	9	5	6.6
DRUGI BAKT. ENTER.	-	2	-	-	-	-	5	1	-	1	9	6	13.0
DRUGI VIRUS. ENTER.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9.6
NOROVIROZA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	54	18.2
JERSINIOZA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0	0.6
ŠIGELOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0
NORICE	-	-	19	-	3	-	3	-	-	-	25	159	120.8
HERPES ZOSTER	-	1	1	1	-	-	2	-	-	4	9	26	34.6
ŠKRLATINKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	22.6
INF. MONONUKLEOZA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5.6
SEPSA	-	1	1	-	1	-	1	2	2	1	9	10	14.0
ERYSIPEL – ŠEN	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	12.4
MENING. BAKTERIJSKI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1.0
LYMSKA BORELIOZA	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	6	11	11.4
HEPATITIS C	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	0.2
GARJE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	3.4
TOKSOPLAZMOZA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	0.4
COVID-19											3941	0	0
<b>SKUPAJ</b>	-	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4020</b>	<b>423.0</b>	<b>305.2</b>
<b>MORBIDITETA/10 000</b>	<b>0.0</b>	<b>1.6</b>	<b>13.2</b>	<b>0.6</b>	<b>2.7</b>	<b>0.9</b>	<b>8.1</b>	<b>2.2</b>	<b>1.1</b>	<b>2.2</b>	<b>132.8</b>	<b>14.0</b>	<b>10.1</b>

### KAPLIČNO PRENOSLJIVE NALEZLJIVE BOLEZNI

V marcu je bilo v vseh upravnih enotah regije Celje prijavljeno **3941** primerov nove koronavirusne bolezni **COVID-19**. Kapljično prenosljive nalezljive bolezni so predstavljale **98.9 %** vseh prijavljenih bolezni. Na prvem mestu je bil **COVID-19**, ki je predstavljal **98.0 %** vseh prijavljenih bolezni iz te skupine.

### ČREVESNE NALEZLJIVE BOLEZNI

Črevesne nalezljive bolezni so predstavljale **0.5 %** vseh prijavljenih bolezni. Zabeležili smo **9 kampilobakterioz, 9 drugih bakterijskih enterokolitsov in po en primer drugega virusnega enterokolitisa, noroviroze, jersinioze in šigeloze**.

### TRANSMISIVNE BOLEZNI

V mesecu marcu smo zabeležili 6 primerov **lymske borelioze**, kar je manj kot marca 2020 in manj od petletnega povprečja (11 bolnikov).

### AKUTNI RESPIRATORNI INFEKTI, GRIPA

V marcu smo od mrežnih zdravnikov za spremljanje ARI in GPB prejeli **430 prijav ARI** (februar 227 ARI).

Od drugih zdravstvenih služb smo prejeli še dodatnih **107 prijav ARI**, kar je več kot meseca februarja (63).

Zabeležili smo **3941 primerov bolezni COVID-19**.

### SEPSE

Prejeli smo **9** prijav sepse. Povzročitelja sta bila *S. pneumoniae* (3) in *E. coli* (2). Prejeli smo dva primera sepse, ki jo povzročajo drugi gramnegativni mikroorganizmi in eno druge vrste opredeljene sepse. Prijavljena je bila ena listerijska sepsa.

### ANTIRABIČNA AMBULANTA

V mesecu marcu smo v antirabični ambulanti obravnavali tri osebe, ko so jih poškodovale živali. V dveh primerih je bil povzročitelj pes, v enem pa mačka.

## EPIDEMIOLOŠKE NOVICE

Na spletni strani NIJZ je objavljeno Letno poročilo: Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v regiji Celje. V letu 2020 smo na Celjskem zabeležili 23515 prijav nalezljivih bolezni, kar je več od petletnega povprečja. Med najpogostje prijavljenimi boleznimi je bil COVID-19 (20102), gripa (689), borelioza lyme (690 prijav), norice (599 prijav) in herpes zoster (252 prijav). Celotno poročilo je dostopno na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/sl/celjski-epidemioloski-vestnik>

**Priporočen razmik med cepljenjem proti COVID-19 in drugimi cepljenji (npr. proti KME) je 14 dni.** Kar pomeni, da pri cepljenju s cepivom Comirnaty in Moderna cepimo proti ostalim boleznim 14 dni pred prvim ali 14 dni po drugem odmerku. V vmesnem času drugega cepljenja ne izvajamo. Pri uporabi cepiva AstraZeneca, cepimo proti ostalim boleznim 14 dni pred prvim odmerkom in nadaljujemo 14 dni po prvem odmerku.